Dow AgroSciences

Dithane™ 600

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INGREDIENTE ACTIVO:

Mancozeb* ..... **600 g/l**
Complejo de Etilenbis Ditiocarbamato de Manganeso y Zinc de formulación a 20 °C.

Ingredientes aditivos: ..... **c.s.p. 1 litro**

**: El material grado técnico mancozeb tiene un contenido de etilentiourea (ETU) como impureza menor a 1g/kg (0.1% p/p)*

Registro No.: 001-F45/NA
Titular de Registro: ConsultLMZ Cia Ltda., representante de Dow AgroSciences de Colombia S.A. en Ecuador

FABRICADO POR:
Dow AgroSciences de Colombia S.A.
Diagonal 92 No. 17A - 42
Bogotá (57 1) 2196000
Soledad - Atlántico (57 5) 3759300

Dow AgroSciences

DISTRIBUIDO POR:
FarmAgro S.A.
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7
Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263
Parque Industrial Vergeles
Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador
Ferpacific S.A.
El Oro # 101 y la Ría. Guayaquil, Ecuador
Tel. 04 258-1177
Fertisa S.A.
Av. Don Bosco 5 y la N, Guasmo
Fertisa (Vía Puerto Marítimo)
PBX: (593 4) 2484 632
Unión de Bananeros Ecuatorianos S.A.
Av. Las Monjas No. 10 y Av. C.J. Arosemena
Telf. (593-4) 220-4850. Guayaquil, Ecuador.

FarmAgro El compadre del agro Ferpacific S.A. fertisa Logban

® ™ **Marca de The Dow Chemical Company ("Dow") o una compañía afiliada de Dow**

P.V.P.

CATEGORÍA TOXICOLÓGICA III - LIGERAMENTE PELIGROSO

CUIDADO

Rev. Ago/2013

Dow AgroSciences

Dithane™ 600

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

INSTRUCCIONES DE USO Y MANEJO:

CONSULTE CON UN INGENIERO AGRÓNOMO

Dithane™ 600 es un fungicida preventivo recomendado para el control de Sigatoka negra en el cultivo de banano.

INSTRUCCIONES DE USO

CULTIVO	ENFERMEDAD	DOSIS	P.C	P.R
BANANO *(Musa acuminata AAA)*	Sigatoka negra *(Mycosphaerella fijiensis)*	1.75 l/ha	0 días	12 horas

P.C: Período de carencia
P.R: Período de reentrada

MODO DE EMPLEO:
Dithane™ 600 puede ser usado tanto en la temporada de invierno como la de verano. La aplicación es de tipo foliar dirigida a la parte aérea de la planta. Una buena cobertura con la mezcla de aspersión es importante a fin de cubrir de forma homogénea todo el follaje de la planta. No aplicar **Dithane™ 600** con síntomas de la enfermedad que sobrepasen niveles moderados de infección.

INSTRUCCIONES DE USO:
Dithane™ 600 es recomendado para el combate de Sigatoka negra del banano y como método para el manejo de resistencia de los fungicidas sistémicos. El producto puede ser usado en agua sola, en emulsiones agua-aceite o en mezclas con sistémicos. Para preparar la mezcla en agua sola disolver completamente la cantidad de **Dithane™ 600** que se vaya a utilizar en un balde, luego depositarla en el tanque de mezcla que contenga agua hasta la mitad de su capacidad. Completar el volumen total de agua y agitar para que la mezcla sea homogénea. Agitar la mezcla cada vez que se vaya a llenar el tanque.

FRECUENCIA Y ÉPOCA DE APLICACIÓN:
Aplicar por ocho o más ocasiones, a intervalos de 7 días (dependiendo de la severidad de ataque y de las condiciones climáticas reinantes). No aplicar cuando exista posibilidad de lluvia ni inmediatamente después de ésta, aplíquese cuando las hojas se hayan secado. No aplicar si el viento excede los 10 km/h. Aplicar el producto en las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde, cuando las hojas del cultivo estén completamente abiertas.

Dow AgroSciences

Dithane™ 600

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

EQUIPOS Y VOLUMEN DE MEZCLA:
Se puede aplicar por aspersión vía aérea o con equipos terrestre como bombas de espalda o de motor equipadas con boquillas tipo Aspersor micronair adaptado, que simula aplicación aérea. Los tanques de preparación se deben lavar muy bien antes y después de preparar la mezcla del producto.

COMPATIBILIDAD Y FITOXICIDAD:
Si se utiliza este producto a las dosis recomendadas en esta etiqueta no es esperable que se presenten problemas de fitotoxicidad.

INFORMACIÓN SOBRE RESPONSABILIDAD CIVIL:
El titular del registro garantiza que las características físico - químicas del producto contenido en este envase corresponden a las anotadas en la etiqueta y que es eficaz para los fines aquí recomendados, si se usa y maneja de acuerdo con las condiciones e instrucciones dadas.

Dow AgroSciences

Dithane™ 600

Eiqueta Web - Ecuador

FUNGICIDA AGRÍCOLA SUSPENSIÓN CONCENTRADA - SC

LEER CUIDADOSAMENTE ESTA ETIQUETA ANTES DE USAR EL PRODUCTO

MANTÉNGASE BAJO LLAVE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:

FRASES DE ADVERTENCIA:
Evitar su inhalación, ingestión, contacto con la piel, proyecciones a los ojos y la contaminación de los alimentos. No comer, beber o fumar durante las operaciones de mezcla y aplicación. Conservar el producto en el envase original, etiquetado y cerrado.
Después de usar el producto cámbiese, lave la ropa contaminada y báñese con abundante agua y jabón.
CUIDADO: Evite el contacto, posible Teratógeno.
CUIDADO: Evite el contacto, posible Carcinógeno.
Utilice ropa protectora durante el manipuleo y aplicación. No ingresar al área tratada en las primeras 12 horas. El contacto prolongado o repetido puede causar reacciones alérgicas en ciertas personas.

INSTRUCCIONES DE PRIMEROS AUXILIOS:
En caso de INTOXICACIÓN llame al MÉDICO inmediatamente, o lleve al paciente al MÉDICO Y MUÉSTRELE LA ETIQUETA.
EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Lavarlos cuidadosamente con abundante agua limpia durante 15 minutos y SI EL CONTACTO FUESE CON LA PIEL, lavarse con abundante agua fría y jabón.
EN CASO DE INHALACIÓN: Retirar al paciente del área expuesta y llevarlo al aire libre. Mantenerlo en reposo en un lugar abrigado.
EN CASO DE INGESTIÓN: Administrar dos tazas de agua sólo si el paciente está consciente y no inducir al vómito. Consultar con un médico.
No existen antídotos específicos. Los síntomas probables de ingestión son náusea, vómitos e irritación gástrica. El tratamiento de la exposición deberá ser dirigido al control de los síntomas y a la condición clínica del paciente.

Emergencias Toxicológicas y Químicas 24 Horas
CITOX 04-2451022.

MANEJO Y DISPOSICIÓN DE DESECHOS Y ENVASES:
Después de usar el contenido, enjuague tres veces este envase y vierta la solución en la mezcla de aplicación y luego inutilícelo, triturándolo y perforándolo y deposítelo en el lugar destinado por las autoridades locales para este fin. Ningún envase que haya contenido el plaguicida debe reusarse.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE:
Tóxico para peces y microcrustáceos acuáticos. Prácticamente no tóxico para aves, abejas y lombrices de tierra.
No contaminar ríos, lagos, o fuentes de agua. No alimentar al ganado ni a otros animales en los lugares de aplicación.

Para mayor información diríjase a **FarmAgro S.A.**
Km 9.5 Vía Daule, Los Vergeles 1-6-7 Junto a Sal. Del Pacífico, Manzana 263. Parque Industrial Vergeles. Teléfono: 04 2590600 Guayaquil, Ecuador